

SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PUEDEN SUGERIR LA PRESENCIA DE EICR

EICR: ENFERMEDAD INJERTO CONTRA RECEPTOR

La EICR puede manifestarse en su forma aguda, crónica o en ambas.

Tener una de estas formas de EICR no implica que se desarrolle también la otra.

En esta infografía pretendemos mostrarte signos y síntomas sugestivos de EICR para que puedas tenerlos en cuenta y comentarlos con tu equipo médico. Estos son muy inespecíficos y pueden ser debidos a otras causas, pero detectarlos y tratarlos a tiempo puede mejorar el pronóstico. Por ello, si experimentas alguno de estos síntomas, contacta con tu equipo de trasplante.

La EICR puede afectar a cualquier mucosa del cuerpo: boca, ojos, mucosa vaginal, intestinal, entre otros

LA EICR CRÓNICA EN LA MUCOSA ORAL

- ✓ Boca seca
- ✓ Mayor sensibilidad a los sabores de los alimentos y/o cambios en el gusto
- ✓ Dificultad para tragar
- ✓ Encías muy sensibles con dolor o sangrado
- ✓ Sensación en la boca y/o lengua áspera
- ✓ Mayor propensión a llagas o lesiones bucales
- ✓ Placas blancas o amarillentas en la boca (encías o lengua)

LA EICR CRÓNICA EN LAS ARTICULACIONES

- ✓ Rigidez articular
- ✓ Dolor
- ✓ Calambres

LA EICR CRÓNICA EN EL SISTEMA DIGESTIVO

- ✓ Náuseas
- ✓ Vómitos
- ✓ Diarrea
- ✓ Dolor estomacal
- ✓ Pérdida de peso

LA EICR CRÓNICA EN LA PIEL

- ✓ Sarpullido
- ✓ Picazón
- ✓ Sequedad y tirantez de la piel
- ✓ Engrosamiento de la piel que puede limitar el movimiento de las articulaciones (esclerodermia)
- ✓ Cambio de color de la piel (a más oscuro o más claro)
- ✓ Cambio de textura o debilidad en las uñas
- ✓ Pérdida de vello en las zonas afectadas

LA EICR CRÓNICA EN LOS OJOS

- ✓ Sequedad ocular
- ✓ Ojos rojos o irritación persistente
- ✓ Molestias con la luz o el viento
- ✓ Trastornos en la agudeza visual (visión borrosa)
- ✓ Ojos llorosos



Es importante una valoración y seguimiento oftalmológico

LA EICR CRÓNICA EN LOS PULMONES

- ✓ Tos seca que persiste en el tiempo sin causa identificable
- ✓ Dificultad para respirar, aunque la actividad sea suave
- ✓ Sensación de que no puede respirar profundamente



A menudo, ocurre en pacientes que también tienen afectada la piel y las mucosas de la boca u ojos.

LA EICR CRÓNICA EN LOS GENITALES



Sexo femenino



- ✓ Irritación
 - ✓ Picazón vaginal
 - ✓ Ardor
 - ✓ Sequedad
 - ✓ Afectación en la piel interna de la vagina que puede acarrear pérdida de elasticidad de esta y/o estrechamiento del canal vaginal
- Dolor durante las relaciones sexuales



Sexo masculino

- En hombres la EICR crónica puede afectar al pene.
- ✓ Cambio de color, enrojecimiento, ardor o dolor en la piel del glande
 - ✓ Dificultad o dolor al retraer el prepucio
 - ✓ Cicatrices o adherencias en la piel del prepucio

SIGNOS Y SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE EICR AGUDA

MANIFESTACIONES HEPÁTICAS*

- ✓ Coloración amarillenta en ojos y piel (ictericia)
- ✓ Orina oscura
- ✓ Hinchazón en piernas y/o vientre



MANIFESTACIONES GASTROINTESTINALES*

Síntomas en el tracto digestivo superior:

- ✓ Náuseas
- ✓ Vómitos persistentes
- ✓ Pérdida del apetito
- ✓ Sentirse lleno tras comer poca cantidad
- ✓ Pérdida de peso

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS*



Son lesiones que pueden llegar a ser pruriginosas (que pican) e incluso dolorosas.



Síntomas en el tracto gastrointestinal inferior:

- ✓ Diarrea
- ✓ Dolor abdominal
- ✓ Hinchazón abdominal
- ✓ Sangre en heces

*Las lesiones de EICR aguda a veces pueden ser indistinguibles de las producidas por otras causas y requieren realizar otras pruebas para llegar a un diagnóstico. Por ello, es fundamental que el diagnóstico y manejo de la EICR se realice por parte de un equipo médico especializado.



Para información más detallada, descarga el manual práctico de la EICR

Es importante una valoración y seguimiento de todos estos síntomas por el especialista

EICR: enfermedad injerto contra receptor.

1. Manual práctico sobre la Enfermedad Injerto contra Receptor para pacientes y cuidadores. Fundación Josep Carreras. 2024. Disponible en: <https://fcarreras.org/blog/eicr/> Última consulta julio 2024

Este folleto es educativo. En ningún caso sustituye las recomendaciones de tu médico. Ante cualquier duda, consulta con tu médico.

sanofi